

Psicoses Orgânicas

- “Todas aquelas situações psicopatológicas (clínico - psiquiátricas) que resultam de uma lesão cerebral mais ou menos concreta e que podem ser devidas a múltiplos factores patológicos do tipo degenerativo, vascular compressivo, ou outros”.
- “As manifestações psiquiátricas mais representativas deste grupo são as situações de carácter demencial, cujos factores patogénicos nem sempre são fáceis de distinguir daqueles que determinam os fenómenos de envelhecimento” (Fonseca, 1987)

Disfunção primária ou secundária

- Anomalia psicológica essencial ou comportamental associada a uma disfunção cerebral transitória ou permanente.
- Distúrbios Mentais Orgânicos – secundários a uma afecção cerebral primária, a uma doença sistêmica ou ao uso continuado de uma substância tóxica.
- O distúrbio mental orgânico mais comum deriva do envelhecimento cerebral.

Diagnóstico dos distúrbios mentais orgânicos:

- Pela presença de sintomas que definem um dos síndromes clássicos (Delirium, Demência, Síndrome amnésico, Alucinação orgânica,
- Pela demonstração através da história clínica, e exames físicos ou laboratoriais, do factor etiológico relacionado com o estado mental anómalo.

- Demências
 - Pré-senis
 - Senis
 - Tóxicas (Alcoólicas...)
- Psico-Síndrome Cérebro-Focal
 - Síndrome Frontal
 - Síndrome Temporal
 - Síndrome Parietal

Classificação Clínica

- **Demências Primitivas** (Senis, Pré-senis e algumas arterioescleróticas)
- **Demências Secundárias** (Pós-confusionais e Toxi-infecciosas, Diabetes e Hipertensão, Vesânicas, Pós-tumorais, Pós-traumáticas, Pós-encefalíticas, Creutzfeldt-Jacob, Coreia de Huntington)
- **Demências potencialmente reversíveis** (PGP, Hidrocefalia normotensa, Edema pós-traumático, Encefalopatias de carácter carencial e metabólico)

- **Nível intelectual**
 - Capacidade de abstracção diminuída
 - Diminuição da capacidade de atenção e concentração
 - Diminuição da memória (fixação e evocação)
 - Sugestionabilidade (Por relaxamento do juízo)
 - Infantilização do comportamento
- **Ao Nível afectivo**
 - Humor eufórico ou apático
 - Egoísmo, egocentrismo
- **Ao nível volitivo**
 - Perda da iniciativa
 - Actos impulsivos e delitivos
 - Exibicionismo
- **Ao nível da linguagem**
 - Alterações das funções oral e escrita
 - Ecolália e afasia
- **Ao nível psico-motor**
 - Debilidade ou rigidez muscular
 - Agitação, tremores ou rigidez da marcha
- **Ao nível social e autonomia**
 - Instabilidade nas relações sociais
 - Alterações no controlo dos esfíncteres

- A demência senil surge, em regra, em indivíduos com mais de 60 anos de idade.
- **Causas:**
Idade, hereditariedade, toxicodependências, intoxicações crônicas, emoções intensas e persistentes
- A demência pré-senil surge, em regra, antes dos 60 anos de idade. (Alzheimer, e demência de Pick)

- Início em regra insidioso (pode também ser súbito, ou pós-ictal).
- Início do quadro mais frequente:
 - **Primeiros sintomas:** Mudança do carácter e perda da memória imediata (distracções no trabalho, desorientação e emotividade aumentada).
 - **Sintomas subsequentes:** Ideias de prejuízo, irritabilidade, desconfiança, ciúmes imotivados.

Demência de Alzheimer

- Trata-se de uma forma lenta de evolução sub-aguda, constituindo um síndrome degenerativo do tipo afaso-agnósico-aprático (de predomínio parietal), com agitação psicomotora e hipertonia.
- Aparece entre os 50, 60 anos, é progressiva. Quando aparece mais tardiamente distingue-se mal das demências senis degenerativas.

Demência de Alzheimer

- Parece ter uma natureza genética de tipo multifactorial. Existe uma alteração de natureza bioquímica. Quebra marcada da taxa de acetilcolina por degenerescência dos neurónios colinérgicos.
- **Sintomas mais típicos:**
 - Perda da memória imediata
 - Logoclonia (perseveração das palavras)
 - Ecolália (repetição de sílabas, palavras, ou segmentos de frases)
 - Polilália (repetição das últimas palavras duma frase)

Demência de Pick

- Atrofia cerebral circunscrita (a demenciação progressiva aparece ligada à atrofia das três camadas mais externas dos lobos frontais e temporais).
- **Sintomas:**
 - Polilália
 - Ecolália
 - Mutismo
 - Amimia
 - Humor varia da apatia à euforia
 - Conservação da memória e da orientação nas primeiras fases de evolução da doença.

Psicoses Orgânicas

F I M